duatedantedantedanted

Kisil izium

Vass7R02s336-340



Collection Vassal-Montpellier

OMtp589

Kisil izium 7 R2 s 336-340









NOM Kezil izium EMPLACEMENT 7 Rg 2 1 336. 340 Souche | Mbre | Débourrement | Mbre | Ferti | Floraison | Véraison | Véraison | yeux | début mi/déb grap | lité | début mi/f | fin | début | mi/v | fin | Maturité Grappe : G - M - 2 Dim : Compacité : L - N- C Pour : Mill : - 15.3× 0 Baie: TC - G - M - F Dim:

disc-sph-ell-cv-obov-cyl-fus

Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Fes: inc - colore

Saveur: s - m - ar - fox - herb

Pépins: avec - apyrène Fort : eng Vigueur : 1

ANNEE: 1994

NOM Kisil izium EMPLACEMENT 7 R2 1 336. 340

ne,												
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb			Floraison début mi/f fin			Véi début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	k & & 2 Dei	3,3	7.34	0		TG - 6 disc- r : B-6 r : s -	Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D 1-ov- Rg-N r - fe yrène	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc		L + M -C

NOM Kişil izium

EMPLACEMENT. 7 R.2 s 336. 340

ouche	Whre yeux		mi/déb		Ferti- litó	Flor début	mi/f	The second secon		raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5			27,2° 27,2°		Couleu	TC - (disc-spring) r : B-(Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl	l-fus : inc	: L - M-C
			L								

MOM Kisel izium (262.79)	IMPLACIONINI 7 R2 A 336. 340						
nche veux début mi/déb gran	Ferti- Floraison Véraison Maturité Dité début mi/E fin début mi/v fin						
1 4 21.2 28.2 0 21.2 28.2 0 2 21.2 28.2 0 2 28. 2.96 (-17)	Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C. Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Vigueur:						

N° d'ordre : Kisil izium

Désignation : 7 R 2 A - 336-340 a-5

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure ; glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : planches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 303 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duvateux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbo plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vorte 233.

A pétiole glabre 264 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

4

ilimindiminduotuulaatuul

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Kisil izum 7. R20-336-3404-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

- Calvog1

diminatiminahadi.udadi.ud

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année : 1898

Observateur: Lacombe

Code cépage Nom cépage :

Kisil izium

Emplacement: 4 R2 & 336 - 340

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

Code clone

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3) - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq(3 - sept(4)- plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3)- rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2) rouge jusque

première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1)- présente 9

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1)- présente 9.

oiv 074 profil : plan(1) en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 12 faible 3

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court/1)- plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré (176)

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 200

Observateur TD

Code cepage Nom cepage Code clone

Emplacement: 7 R2,336-340

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique @- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 🔊

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 🗷 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 10 (lenticelles absentes ?) - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence O- présence O

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence () - présence ()

oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (-60mm) D courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - tres longs (>180mm) 9 7 - 4 -

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 petit (8mm) & moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - tres grand (=17mm) 9

Vigets

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9.

oiv 55 2 formation de cal de soudure : très faible 1 | faible 3 - moyen 5 - cle e 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très l'aible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 0

Vassal

Nocids aplatis 1 movens 0 - saillants 3